

3 - Le cancer du côlon-rectum en Loire-Atlantique

Tableau 1 - Admissions en affection de longue durée (1) - codes CIM10 : C18-C21

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Nombre total d'admissions					433	486	479	532	515
Nombre d'admissions chez les 50-74 ans					265	269	260	299	288
Nombre d'admissions chez les 75 ans et plus					141	178	182	188	190

Tableau 2 - Incidence des cancers infiltrants recensés par le registre (démarrage en 1991)

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Nombre total de nouveaux cas	573	570	586	561	578	574	636	651	628
Nombre de nouveaux cas chez les 50-74 ans	351	296	348	292	332	310	328	347	338
Nombre de nouveaux cas chez les 75 ans et plus	189	230	196	212	212	227	260	260	254
Taux d'incidence standardisé (2)	31,8	29,6	30,9	28,8	29,1	28,1	30,0	30,8	28,9

Tableau 3 - Mortalité - codes CIM9 : 153-154 ; CIM10 : C18-C21


	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Nombre total de décès	324	304	289	318	301	275	308	283	
Taux moyen de mortalité standardisé (3) - Hommes	41,6	40,8	39,8	40,3	38,3	38,5	34,9		
Taux moyen de mortalité standardisé (3) - Femmes	23,6	22,9	21,9	20,3	19,8	18,8	18,6		

Sources : URCAM - DRSM Pays de la Loire, Registre des cancers de Loire-Atlantique, INSERM CépiDc, INSEE RP 90

Exploitation ORS


- (1) données qui concernent les personnes protégées par le régime général, le régime agricole (MSA) et le régime des professions indépendantes (AMPI)
- (2) taux pour 100 000 habitants standardisé sur la population mondiale
- (3) taux pour 100 000 habitants standardisé sur la population française, moyenne sur les 3 années n-1, n, n+1

Figure 1 - Evolution du taux d'incidence standardisé (2) du cancer colo-rectal (infiltrant) en Loire-Atlantique depuis 1995



Source : Registre des cancers de Loire-Atlantique

Figure 2 - Evolution du taux de mortalité (3) par cancer colo-rectal en Loire-Atlantique et en France métropolitaine depuis 1981



Sources : INSERM CépiDc, INSEE RP90

Exploitation ORS

3 - Le cancer du côlon-rectum en Loire-Atlantique

Situation épidémiologique actuelle

- Le registre des cancers de Loire-Atlantique apporte des données précises sur l'incidence du côlon-rectum dans le département. Selon ce registre, 628 nouveaux cas de cancers du côlon-rectum infiltrants ont été diagnostiqués en 2003 parmi les habitants du département (tableau 2 page 44).
- Les statistiques d'admissions en affection de longue durée (ALD) pour cancer du côlon-rectum, établies par l'URCAM et la DRSM pour les trois principaux régimes d'assurance maladie, constituent une source d'information complémentaire sur l'incidence. Selon ces données, 515 personnes ont été admises en ALD pour cancer du côlon-rectum en 2003 en Loire-Atlantique (tableau 1).
- Chez les personnes de 50 à 74 ans, tranche d'âge potentiellement concernée par le dépistage organisé, le registre a dénombré 338 cas de cancers du côlon-rectum en 2003, ce qui représente 54 % du nombre total de nouveaux cas dénombrés pour cette pathologie.
- Selon les statistiques annuelles de mortalité établies par l'Inserm CépiDc et disponibles jusqu'en 2002, le nombre de décès par cancer du côlon-rectum parmi les habitants de Loire-Atlantique a été de 289 en moyenne chaque année sur la période 2000-2002 (tableau 3).

Tendances évolutives

- Le département de Loire-Atlantique connaît comme l'ensemble de la France une augmentation du nombre de nouveaux cas de cancers du côlon-rectum enregistré par le registre, qui est passé de 573 en 1995 à 628 en 2003, ce qui correspond à une progression annuelle moyenne de 1,2 %. Cette évolution résulte principalement de l'accroissement et du vieillissement de la population. Sur cette période, le taux d'incidence standardisé oscille entre 28,1 et 31,8 pour 100 000, sans qu'il soit possible de dégager une tendance évolutive (figure 1 page 44).

Les données concernant les admissions en affection de longue durée pour cancer du côlon-rectum montrent que leur nombre a augmenté sensiblement entre 1999 et 2003 (+4,4 % par an). Cette progression marquée des admissions en ALD sur les années récentes doit toutefois être interprétée avec prudence en raison du caractère médico-administratif de ces données. La mise en place en 2000 d'une nouvelle disposition tarifaire (majoration des honoraires pour les visites de patients de plus de 75 ans en ALD), a notamment pu inciter les praticiens à demander l'admission en ALD de certains patients n'en bénéficiant pas jusque-là, et contribuer ainsi à l'augmentation observée.

- L'évolution depuis le début des années 80 du taux standardisé de mortalité par cancer du côlon-rectum, calculé sur des périodes glissantes de trois ans, est représentée sur la figure 2 page 44 pour chacun des deux sexes.

Chez les hommes de Loire-Atlantique, le taux de mortalité a oscillé entre 36,6 et 42,4 pour 100 000 entre le début des années 80 et le milieu des années 90, sans qu'il soit possible de dégager une tendance évolutive. Depuis le milieu des années 90, il suit une tendance à la baisse (-1,4 % par an entre 1994 et 2001) comme le taux national (-1,8 %). Il reste supérieur au taux national, avec des écarts le plus souvent statistiquement significatifs.

Chez les femmes de Loire-Atlantique, le taux de mortalité connaît, malgré des fluctuations importantes, une tendance générale à la baisse depuis le début des années 80 (-1,4 % par an), comme le taux national (-1,3 %), tout en restant le plus souvent statistiquement non différent de ce dernier.